


Datos sobre el cáncer relacionado con el tabaco

El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos, tanto para hombres como para mujeres. El cáncer de pulmón es la forma más prevenible de muerte por cáncer en nuestra sociedad.¹ En el 2011 se esperan 221.130 casos nuevos de cáncer de pulmón, de los cuales 115.060 serán en hombres, mientras 106.070 será en mujeres. También habrán 156.940 muertes por cáncer de pulmón. 85.600 de estas muertes serán en hombres y 71.340 serán en mujeres. El tabaquismo puede causar los siguientes problemas ->

En los Estados Unidos, el tabaquismo toma casi 1 de cada 5 muertes, lo que es igual a 443.000 muertes prematuras cada año (2000 al 2004).¹ Las muertes por el tabaquismo son al menos el 30% de las muertes por cáncer y 87% de estas son por cáncer de pulmón.¹

El primer Informe del Cirujano General de EE.UU., *Tabaquismo y Salud*, en 1964 causo un descenso en el uso de cigarrillos. En el 2010, un 22% de hombres y 17% de mujeres aun fumaban, de estos 80% fuman a diario.²

Porcentaje de Fumadores en Estados Unidos



LOS RIESGOS DEL TABACO

► Porcentaje de las posibilidades que tienen los fumadores de contraer enfermedades.

DISTINTOS TIPOS DE CANCER

Leucemia mieloide.

15 a 20%

Cáncer de laringe y boca.

15 a 20%

Cáncer de esófago.

15 a 20%

Cáncer de pulmón **70%**

11 de cada 12 personas que contraen cáncer de pulmón es a causa del cigarrillo.

Cáncer de hígado.

15 a 20%

Cáncer de riñón y de páncreas.

15 a 20%

Cáncer de estómago.

15 a 20%

Cáncer de vejiga / Cuello uterino.

40 a 45%

AFECCIONES CARDIOVASCULARE

Disminución del flujo sanguíneo cerebral.

40 a 45%

Arritmias, taquicardias, infartos, muerte súbita.

45%

Si las tendencias actuales continúan, el tabaco matará más de **100 millones de personas** en las primeras dos décadas del siglo XXI.

Fuente: OMS

CLARIN

El consumo de cigarrillos entre los mayores de 18 años se redujo 50% entre 1965 y 2009 - del 42% al 21% - pero casi 47 millones de estadounidenses aun fuman.¹

En 1997, casi la mitad (48%) de los varones y más de un tercio (36%) de las mujeres estudiantes de secundaria reportaron haber usado alguna forma de tabaco—cigarrillos, cigarros o productos de tabaco—en el último mes. El porcentaje bajo un 30% para los varones y el 22% para mujeres estudiantes en el 2009. Aun así, entre los estudiantes de 12º grado, el 40% de los niños y el 26% de las niñas habían consumido tabaco en el último mes.^{1,3}

1 American Cancer Society. *Cancer Facts & Figures 2011*. Atlanta: American Cancer Society; 2011.

2 Centers for Disease Control and Prevention. *Morbidity and Mortality Weekly Report (9/10/10)*. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2010.

3 Centers for Disease Control and Prevention. *Morbidity and Mortality Weekly Report (6/4/10)*. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2010.

4 Mente Sana En Cuerpo Sano. *Los Riesgos del Tabaco*. July 2010.